



Commissione Tecnica Regionale Farmaci

Esiti della seduta – convocazione per via telematica del 26 agosto 2023

Argomento all'ordine del giorno	Esito della seduta della CTRF
1. Individuazione Centri prescrittori 1.1. VYVGART - efgartigimod alfa indicato in aggiunta alla terapia standard per il trattamento dei pazienti adulti con miastenia gravis generalizzata (gMG) che sono positivi all'anticorpo anti recettore dell'acetilcolina (AChR) 1.2. PADCEV - enfortumab vedotin indicato, in monoterapia, per il trattamento di pazienti adulti con cancro uroteliale (UC) localmente avanzato o metastatico che hanno precedentemente ricevuto una chemioterapia contenente platino e un inibitore del recettore di morte programmata 1 o un inibitore del ligando di morte programmata 1 1.3. KEYTRUDA - pembrolizumab in associazione a chemioterapia con o senza bevacizumab, è indicato nel trattamento del carcinoma della cervice persistente, ricorrente o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS maggiore o uguale a 1 1.4. KEYTRUDA - pembrolizumab in monoterapia è indicato nel trattamento adiuvante di adulti con melanoma in stadio IIB, IIC e che sono stati sottoposti a resezione completa 1.5. TECENTRIQ- atezolizumab in monoterapia è indicato come trattamento adiuvante dopo resezione chirurgica completa del tumore e chemioterapia contenente platino in pazienti adulti con NSCLC ad alto rischio di recidiva, i cui tumori presentano un'espressione di PD-L1 $\geq 50\%$ sulle cellule tumorali (TC) e sono negativi per mutazioni di EGFR o riarrangiamenti di ALK 1.6. Associazione LENVIMA – levantinib e KEYTRUDA - pembrolizumab nel trattamento del carcinoma dell'endometrio avanzato o ricorrente negli adulti con progressione della malattia durante o dopo un precedente trattamento con una terapia contenente platino in qualsiasi setting e che non sono candidati a chirurgia curativa o radioterapia 1.7. KEYTRUDA - pembrolizumab in monoterapia per il trattamento adulti con carcinoma dell'endometrio avanzato con alta instabilità dei microsatelliti (MSI-H) o deficit del mismatch repair (dMMR) avanzato o ricorrente, con progressione della malattia durante o dopo un precedente trattamento con una terapia contenente platino in qualsiasi setting e che non sono candidati a chirurgia curativa o radioterapia.	1.1. La CTRF conclude la valutazione. 1.2. La CTRF conclude la valutazione. 1.3. La CTRF conclude la valutazione. 1.4. La CTRF conclude la valutazione. 1.5. La CTRF conclude la valutazione. 1.6. La CTRF conclude la valutazione. 1.7. La CTRF conclude la valutazione. 1.8. La CTRF conclude la valutazione. 1.9. La CTRF conclude la valutazione.



1.8. KEYTRUDA - pembrolizumab in associazione a chemioterapia contenente platino e fluoropirimidina, è indicato nel trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma dell'esofago localmente avanzato non resecabile o metastatico o adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea HER-2 negativo negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS ≥ 10

1.9. OPDIVO - nivolumab in associazione a chemioterapia contenente platino e fluoropirimidina, è indicato nel trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule squamose dell'esofago, avanzato non resecabile, ricorrente o metastatico, con espressione tumorale del PDL1 $>1\%$