



COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FARMACI
ORDINE DEL GIORNO
Seduta in Teleconferenza del 18.6.2020

- 1. NOTA 97 AIFA sulla prescrizione dei nuovi anticoagulanti orali ad azione diretta da parte degli specialisti e dei medici di medicina generale, in corso di emergenza COVID-19**

Comunicazione Dott.ssa Scroccaro

2. Individuazione Centri prescrittori

- 2.1 KISQALI – Ribociclib** in associazione a un inibitore dell'aromatasi o a fulvestrant, è indicato nelle donne con carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivo per il recettore ormonale (HR) e negativo per il recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano (HER2), come terapia iniziale a base endocrina o in donne che hanno in precedenza ricevuto una terapia endocrina. In donne in pre- o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH).

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.2 FASLODEX - Fulvestrant

- indicato per il trattamento del carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico con recettori per gli estrogeni positivi nelle donne in post -menopausa non precedentemente trattate con terapia endocrina;
- in associazione a palbociclib per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2) in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente. In donne in pre - o perimenopausa, la terapia di associazione con palbociclib deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH).

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

- 2.3 LIBTAYO – Cemiplimab** in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma cutaneo a cellule squamose metastatico o localmente avanzato che non sono candidati ad intervento chirurgico curativo o radioterapia curativa.

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero



2.4 JINARC – Tolvaptan indicato per rallentare la progressione dello sviluppo di cisti e dell'insufficienza renale associata al rene policistico autosomico dominante (ADPKD) in adulti con CKD di stadio da 1 a 4 all'inizio del trattamento, con evidenza di malattia in rapida progressione.

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.5 ZEMPLAR – Paracalcitolo

- indicato per la prevenzione ed il trattamento dell'iperparatiroidismo secondario in pazienti adulti e pediatrici di età compresa tra i dieci e i sedici anni associato a malattia renale cronica negli stadi 3 e 4;
- indicato per la prevenzione ed il trattamento dell'iperparatiroidismo secondario in pazienti adulti associato a malattia renale cronica di stadio 5 in pazienti sottoposti ad emodialisi o a dialisi peritoneale.

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.6 TAKHZYRO – Lanadelumab indicato per la prevenzione di routine degli attacchi ricorrenti di angioedema ereditario (HAE) in pazienti di età pari o superiore a dodici anni.

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.7 CIMZIA - Certolizumab pegol indicato per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave in pazienti adulti che sono candidati per la terapia sistemica

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.8 MYALEPTA – Metreleptina indicato in aggiunta alla dieta come terapia sostitutiva per il trattamento delle complicanze da deficit di leptina in pazienti affetti da lipodistrofia (LD): con diagnosi confermata di LD generalizzata congenita (sindrome di Berardinelli-Seip) o di LD generalizzata acquisita (sindrome di Lawrence) negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a due anni.

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

3. Modifica Piano Terapeutico PMA (Procreazione Medicalmente Assistita)

Istruttoria: Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici

4. Varie ed eventuali

- **Calendario delle riunioni del II semestre 2020**